

2023 年“中银杯”四川省职业院校技能大赛（高职组）  
护理技能赛项方案竞赛样题

一、【单项选择题】每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，多选、少选或不选均不得分。

1.病毒性心肌炎患者的治疗要点不包括（）

- A.预防心力衰竭
- B.抗生素治疗
- C.抗病毒治疗
- D.急性期卧床休息
- E.防治心律失常

2.患者，男，50 岁。患肝硬化入院。自诉“皮肤瘙痒，睡觉的时候会把皮肤挠破”。皮肤瘙痒的原因可能是（）

- A.叶酸缺乏
- B.凝血时间延长
- C.胆红素水平提高
- D.高钾血症
- E.低蛋白血症

（3-5 题共用题干）

患者，女，25 岁，因皮肤出现瘀点、瘀斑及月经过多就诊，门诊以“慢性特发性血小板减少性紫癜”收入院。

3.导致其血小板减少的主要原因是（）

- A.出血

B.脾脏肿大及功能亢进

C.病毒感染

D.雌激素抑制血小板生成

E.自身免疫反应

4.其血小板计数一般在 ( )

A.  $< 20 \times 10^9/L$

B.  $20-30 \times 10^9/L$

C.  $30-80 \times 10^9/L$

D.  $80-100 \times 10^9/L$

E.  $> 100 \times 10^9/L$

5.其治疗首选药物为 ( )

A.血小板悬液

B.糖皮质激素

C.止血药

D.环磷酰胺

E.雄激素

(6-8 题共用题干)

患者，男，28岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：体温  $38.8^{\circ}\text{C}$ ，脉搏 118 次/分，血压 118/78mmHg，右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室检查：白细胞  $14.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例 0.82

6.该患者阑尾位置最可能位于 ( )

A.靠近闭孔外肌

B.腰大肌前方

C.盲肠中位

D.腰大肌后方

E.腰大肌侧面

7.根据患者的临床表现，判断下列最不可能出现的情况为（）

A.阑尾穿孔

B.阑尾化脓感染

C.阑尾坏疽

D.炎性渗出

E.炎症局限于粘膜下层

8.针对患者目前情况，下列措施不妥当的是（）

A.手术下切除阑尾

B.腹腔镜下切除阑尾

C.阑尾切除

D.阑尾切除+腹腔引流管置入

E.非手术治疗

9-11 题共用题干

患者男，68岁，今晨起床后突然跌倒，出现口眼歪斜，言语不清。既往有高血压、糖尿病、冠心病史。查体：神志清醒，血压138/90mmhg，口角歪斜，右侧上下肢瘫痪，颅脑CT未见异常。

9.该患者最可能的诊断是（）

- A.脑血栓形成                      B.脑出血                      C.脑栓塞  
D.蛛网膜下腔出血              E.短暂性缺血发作

10.该患者首选的治疗方法是（ ）

- A.调整血压                      B.溶栓治疗                      C.应用止血剂  
D.手术治疗                      E.脑保护剂

11.该患者的护理措施不妥的是（ ）

- A.保持肢体功能位                      B.翻身、拍背  
C.调整饮食以防便秘发生              D.鼓励患者多饮水  
E.由于瘫痪肢体不易移动，可将静脉输液放在瘫痪肢体侧

(12-13 题共用题干)

患者，男，55岁，头痛3个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内肿瘤、颅内压增高，拟行开颅手术。

12.入院后第3日，患者出现剧烈头痛呕吐频繁，烦躁不安，右侧瞳孔散大，左侧肢体肌力减退，病理征阳性。此时可能出现了（ ）

- A.左侧颞叶疝  
B.大脑镰下疝  
C.枕骨大孔疝  
D.高血压危象  
E.右侧颞叶疝

13.行开颅手术后，医师在手术中放置了脑室引流，术后引流管护理，不妥的是（ ）

- A.引流管开口高于侧脑室平面 15cm

- B.妥善固定引流管
- C.每日引流量以不超过 500ml 为宜
- D.定时无菌生理盐水冲洗
- E.观察并记录引流液的颜色、性状和量

答案：D

(14-15 题共用题干)

患者，男，14 岁，因多饮多尿 5 年，双眼视物不清 3 年，头痛伴呕吐 2 个月入院。经检查诊断为颅咽管瘤。

14.首选的治疗方法是（ ）

- A.手术治疗
- B.化学治疗
- C.放射治疗
- D.免疫治疗
- E.基因治疗

15.术后患者出现多尿，每日尿量大于 4000ml，尿比重低于 1.005。

可能发生的并发症是（ ）

- A.尿失禁
- B.颅内高压
- C.泌尿系统感染
- D.药物副作用
- E.尿崩症

16.在静脉补钾时，假设 200ml 液体，最多可加入 10%氯化钾的

量是 ( )

A.12ml

B.10ml

C.8ml

D.6ml

E.3ml

(17-18 题共用题干)

患者，女，30岁，颈部增粗，伴食欲亢进、消瘦、手颤、怕热、多汗半年，以原发性甲亢收入院。查体：眼球突出，眼裂增大，甲状腺弥漫性肿大、质软、可触及震颤，闻及血管杂音。血压 140 / 90mmHg，脉搏 120 次 / 分，准备手术治疗。

17.该患者应用以下哪种药物进行术前准备 ( )

A.阿托品

B.普萘洛尔

C.复方碘化钾

D.钙剂

E.甲状腺片

18.服药方法为 ( )

A.每日 3 次，从 3 滴开始，逐日增加 1 滴至 16 滴维持

B.每日 2 次，从 10 滴开始，逐日增加 1 滴至 20 滴

C.每日 15 滴开始，每日 2 次，逐日减少至 5 滴维持

D.每日 15 滴开始，每日 2 次，逐日减少至 3 滴维持

E.每日 2 次从 5 滴开始，逐日增加 1 滴至 15 滴维持

19.患者，刘某，41 岁，因交通事故致伤昏迷，3 小时后入院，患者处于昏迷状态，呼之不应，但按压眶上神经有反应，左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。入院第 2 天，血压 150/100mmHg，脉搏缓慢有力，呼吸深而慢，时而躁动、呕吐，按压眶上神经无反应，左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体瘫痪，病理反射阳性。若进行手术治疗，则手术后护理的是（ ）

A.高渗性脱水药 20%甘露醇 250ml 要在 1 小时内快速静脉滴注

B.冬眠疗法可先用物理降温，再遵医嘱静滴冬眠药物

C.冬眠疗法降温速度以每小时下降 2°C 为宜

D.脱水治疗期间不需记录出入液量

E.防止压疮、呼吸道和泌尿道感染等并发症

（20-21 题共用题干）

患者，男性，28 岁，被重物砸伤左小腿半小时。患者神志清楚，左小腿下 1/3 有长 3cm 斜行皮肤裂伤，骨折端外露，局部畸形，活动障碍，伤口不断有血液渗出，足趾血运好。

20.现场处理后第二天患者患肢小腿部剧烈疼痛进行性加重，严重肿胀，足趾麻木，足背动脉搏动微弱等症状。请问该患者可能发生了什么问题（ ）

A.休克

B.腓总神经损伤

C.骨筋膜室综合征

D.脂肪栓塞

E.关节僵硬

21.此时如果处理不及时，该患者最可能发生下列哪项并发症（）

A.肾功能衰竭

B.肢体坏疽

C.肺栓塞

D.中毒性休克

E.死亡

（22-24 题共用题干）

患者，女性，38岁，5小时前摔伤右前臂。检查发现前臂肿胀，皮肤破损流血，瘀斑，剧痛并有短缩畸形。

22.入院后给以清创复位，石膏外固定。48小时后患者出现体温升高，伤口有少量脓性分泌物，白细胞计数明显升高，此时最可能的情况是（）

A.血肿吸收

B.伤口感染

C.组织坏死

D.骨筋膜室综合征

E.气性坏疽

23.患者恢复后，要拆除石膏，下列注意事项中错误的是（）

A.石膏拆除后，用温水清洗皮肤

B.拆石膏前需向患者解释，拆石膏无痛感，消除患者紧张



C.石膏拆除后，用酒精清洗皮肤

D.清洗后可以在皮肤处涂抹润肤油并按摩局部

E.石膏拆除后，患者刚开始活动时可能稍有不适，以后逐渐减轻

24.石膏拆除后发现前臂肌肉萎缩，肘关节屈伸范围减小，应考虑

( )

A.缺血性肌挛缩

B.骨化性肌炎

C.关节僵硬

D.创伤性关节炎

E.神经损伤

(25-27 题共用题干)

患者，男性，22岁，高处坠落后出现严重呼吸困难、四肢不能活动。入院查体颈部压痛，四肢瘫痪，高热 39.8℃，听诊闻及痰鸣音强。

X线片提示：C4-C5骨折合并脱位。

25.该患者呼吸困难最主要的原因是 ( )

A.腹胀引起膈肌上移

B.呼吸肌麻痹

C.水肿压迫呼吸中枢

D.气管受压

E.痰液阻塞气道

26.对于该患者应首先采取下列哪项措施 ( )

A.吸痰

B.给予镇痛药物

C.气管切开

D.手术复位固定

E.吸氧

27.减轻脊髓水肿和继发性损伤采取的措施的是（）

A.地塞米松 30-40mg 持续静脉滴注 2 周

B.20%甘露醇 250ml 静脉滴注，Bid，5-7 天

C.绝对平卧硬板床

D.枕颌吊带卧位牵引

E.维持动脉压在 90mmHg 以上

28.患者，女性，69 岁。车祸至左股骨颈骨折，移位明显，行全髋关节置换术。术后患肢应采取的体位是（）

A.外展内旋位

B.内收内旋位

C.内收外旋位

D.外展外旋位

E.外展中立位

(29-32 题共用题干)

患者，男性，18 岁，跌倒时左手掌着地 20 分钟。查体：肘部向后突出并处于半屈状，肘部明显肿胀及压痛，肘后三角关系正常。

29.最可能的诊断是（）

A.伸直型肱骨髁上骨折

B.屈曲型肱骨髁上骨折

C.桡骨小头半脱位

D.尺鹰嘴骨折

E.肘关节脱位

30.根据检查结果，最适宜的处理措施是（）

A.单纯石膏固定

B.手法复位石膏固定

C.切开复位内固定

D.骨牵引治疗

E.弹力绷带8字固定

31.患者次日出现发热， $T37.9^{\circ}\text{C}$ ，最常见的原因是（）

A.骨折内出血，血肿吸收

B.伤口感染

C.剧烈疼痛

D.软组织损伤

E.急性骨髓炎

32.给予该患者护理不妥的是（）

A.促进神经循环功能的恢复

B.托起患肢，减轻疼痛

C.预防感染的发生

D.合理饮食

E.严格卧床3个月开始功能锻炼

(33-35 题共用题干)

33.检查发现 T11 椎体爆裂骨折，椎体压缩 1/2，椎管内有较大骨块，伴关节突交锁。目前最适合采取哪种治疗方案（）

A.手术切开复位，椎管减压，脊柱内固定术

B.两点法过伸复位，石膏背心固定

C.激素脱水治疗

D.保守治疗

E.椎板切除、椎管减压术

34.术后第 6 天，截瘫恢复不理想，在护理时，每 2 小时翻身一次，其目的是（）

A.防止肺炎、肺不张

B.防止下肢静脉血栓

C.防止压疮

D.防止尿潴留

E.促进睡眠

35.该患者应该采用哪种翻身方式（）

A.轴线翻身

B.先翻背部

C.先翻下身

D.不能翻身

E.随意翻身

(36-37 题共用题干)

患者，男性，65岁。意外事故至胫骨开放性骨折伴大出血，面色苍白、脉细数。

36.该患者转运到医院后，首先给予的治疗措施是（）

- A.及早彻底清创
- B.及时使用破伤风抗毒素（TAT）
- C.及时复位固定
- D.早期使用抗生素
- E.镇静止痛

37.经治疗后该患者早期功能锻炼的方式合适的是（）

- A.以肢体的舒张为主
- B.进行肢体的等长舒缩
- C.活动骨折上下关节
- D.进行关节的抗阻力活动
- E.配合理疗和体疗

38.患者左侧胸部被匕首刺伤半小时，有胸痛，呼吸急促，口唇发绀。脉搏 120 次/分，血压 9.3/5.3kPa（70/40mmHg）。左侧胸壁有伤口，呼吸时能听到空气出入伤口的响声，气管移向健侧，患侧叩诊呈鼓音。引起患者休克的主要原因是（）

- A.血容量不足
- B.纵隔摆动、回心血量减少
- C.伤侧肺完全萎陷
- D.心脏受压

E.健侧肺部分受压

(39-41 题共用题干)

患者，女性，39岁，因排尿异常入院，诊断为急性泌尿系感染。

39.下列情况最可能出现于该患者的是（）

A.一天排尿次数 3-5 次

B.离心尿检每高倍视野白细胞超过 5 个

C.膀胱容量 300ml

D.每次尿量 400ml

E.24 小时尿量 400ml

40.患者有肉眼血尿,下列叙述的是（）

A.初始血尿提示出血部位在膀胱三角

B.1000ml 尿液含 0.5ml 血液

C.全程血尿提示出血部位在膀胱或者以下部位

D.其尿液镜下每高倍视野可见 2 个红细胞

E.终末血尿提示出血在后尿道或者膀胱三角区

41.为进一步诊治该患者需要做血管造影明确肾脏情况，下列叙述错误的是（）

A.造影后鼓励患者多饮水

B.造影后局部加压包扎，平卧 6 小时

C.造影后观察足背动脉搏动情况

D.造影前做碘过敏试验

E.有出血倾向的患者不宜做该检查

(42-43 题共用题干)

患者，男性，42岁，因车祸致骨盆骨折，尿道流血入院。查体：血压 82/40mmHg，脉搏 128 次/分，下腹压痛，局部肌紧张。

42.对该患者的治疗护理措施错误的是（）

- A.需先行抗休克治疗
- B.导尿试验导尿管多试插几次，若插入困难，不再勉强反复试插
- C.平卧，不随意搬动
- D.确定尿道连续，尿潴留者可行导尿术
- E.尿潴留不宜导尿者可行膀胱穿刺

43.患者行断端吻合术，下列术后护理措施错误的是（）

- A.生命体征的观察
- B.遵医嘱合理补液
- C.规定时间后拔出尿管，尿道不会再发生狭窄
- D.遵医嘱使用抗菌素
- E.发现伤口肿胀、体温升高立即通知医生

44. 风湿性瓣膜病二尖瓣狭窄病人，左房附壁血栓脱落最常见的栓塞部位是（）

- A.肺栓塞
- B.脑栓塞
- C.下肢静脉栓塞
- D.上肢动脉栓塞
- E.肠系膜动脉栓塞

45.患者，男性，25岁，运动后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿。该患者所患疾病保守治疗的适应症是（）

- A.有尿路感染
- B.年老体弱者
- C.肾功能欠佳
- D.肾结石小于直径 0.6cm
- E.肾结石小于直径 1cm

(46-47 题共用题干)

患者，男性，53岁，既往有肺结核病史7年，2周前出现尿频、尿急、尿痛并逐渐加重，且伴有排尿终末阶段可见的肉眼血尿。

46.该患者最可能的诊断是（）

- A.急性膀胱炎
- B.慢性膀胱炎
- C.肾结核
- D.肾肿瘤
- E.前列腺增生

47.最可能的致病途径是（）

- A.输尿管梗阻
- B.细菌由尿道逆行侵入泌尿系统
- C.结核菌经血液播散到肾
- D.细胞异常增生
- E.结节形成



(48-50 题共用题干)

患者，男性，75 岁，因下腹部膨隆饱满，触之感疼痛，自述 18 小时未排尿入院，诊断为前列腺增生，急性尿潴留。

48.该患者尿潴留属于（ ）

- A.急性梗阻
- B.慢性梗阻
- C.动力性梗阻
- D.先天性梗阻
- E.机械性梗阻

49.患者行 TURP 治疗，术后护理措施错误的是（ ）

- A.术后 3-5 天尿液颜色清即可拔出尿管
- B.禁止灌肠
- C.冲洗速度依据尿色而定，色深则慢，色浅则快
- D.指导患者术后 1 周逐渐离床活动
- E.生理盐水冲洗膀胱 3-7 天

50.患者行 TURP 治疗后发生 TUR 综合征，下列叙述错误的是（ ）

- A.严重者可出现肺水肿、脑水肿、心力衰竭
- B.因术后大量冲洗液被吸收致血容量急剧增加，出现稀释性低钠血症
- C.患者在几小时内出现烦躁、呕吐、抽搐、昏迷
- D.术前要协助医生探扩尿道
- E.一旦出现，遵医嘱应用利尿剂、脱水剂，减慢输液速度

51.患者，男性，68岁，因尿频、尿急、尿痛并伴有肉眼血尿症状就诊，经诊断该患者为表浅膀胱肿瘤，首选的治疗方法的是（）

- A.经尿道膀胱肿瘤切除术
- B.膀胱部分切除术
- C.根治性膀胱全切
- D.放疗
- E.化疗

(52-54 题共用题干)

某女性，患者，40岁。因腹痛、寒战高热恶心呕吐及黄疸2天入院，查体：T40°C、P200次/分、BP90/50mmHg，表情淡漠，剑突下压痛明显，白细胞 $55.0 \times 10^9/L$ 。诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎，休克。

52.此患者属于哪一类休克（）

- A.感染性休克
- B.过敏性休克
- C.创伤性休克
- D.失血性休克
- E.心源性休克

53.在休克的同时，应首先采取的治疗措施为（）

- A.吸氧
- B.降温
- C.行胆管切开引流术
- D.纠正酸碱平衡紊乱

E.输血

54.手术前护理时，观察要点不包括以下那一项（）

A.生命体征及神志变化

B.腹部症状及生命体征

C.及时了解实验检查结果

D.患者皮肤瘙痒是否减轻

E.记录 24 小时出入量

(55-57 题共用题干)

患者，男，23 岁，因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷 1 小时，清醒后诉头痛，有呕吐，右上肢肌无力 2 级，脑脊液检查有红细胞，CT 扫描见左额顶叶低密度灶，其中有散在点状高密度影。

55.根据患者目前表现符合（）

A.脑震荡

B.弥散性轴索损伤

C.脑挫裂伤

D.脑干损伤

E.颅内血肿

56.目前的关键处理措施是（）

A.静卧

B.床头抬高  $15^{\circ}$ - $30^{\circ}$

C.营养支持

D.应用抗生素

E.防止脑水肿

57.目前患者病情观察的重点在于及时发现（）

A.呼吸道梗阻

B.颅内压增高、脑疝

C.压疮

D.水、电解质紊乱

E.感染

（58-59 题共用题干）

患者，男，24岁，头部外伤后持续头痛，呕吐数次，嗜睡，急诊入院，CT检查显示颅内占位，初步诊断：颅内占位伴颅内压增高。

58.下列哪项是颅内压增高的三主征表现之一（）

A.呼吸慢而有力

B.脉搏慢而有力

C.视乳头水肿

D.脉压增大

E.血压升高

59.当前首要的处理是（）

A.给予镇痛处理，休息1周

B.给予止呕处理，休息1周

C.急诊行开颅减压术

D.密切监测各项生命体征

E.给予脱水利尿治疗，同时进一步检查

60.患者如果采用脱水治疗，下列描述不的是（）

A.20%甘露醇 250ml，30 分钟内快速静脉滴注

B.1-2 小时后甘露醇可重复使用

C.同时使用利尿剂效果更好

D.停用脱水剂时，应逐渐减量

E.脱水治疗期间，应准确记录出入量

（61-62 题共用题干）

患者，男，30 岁，5 年前健身练哑铃后，反复出现右侧阴囊肿块，夜间平卧时肿块消失。近日因感冒咳嗽多日，今日发现肿块又突然出现，腹痛腹胀、恶心，3 日未排便，查体可见右侧阴囊红肿，可见一梨状肿块，平卧后肿块不消失。

61.该患者最有可能的诊断是（）

A.嵌顿性腹股沟直疝

B.嵌顿性腹股沟斜疝

C.绞窄性股疝

D.睾丸挫伤

E.睾丸扭转

62.腹外疝术后，护士应告知患者（）

A.8 小时后可进行床边活动

B.24 小时后可在病区走廊散步

C.一周后可恢复工作

D.3 个月内不宜从事重体力劳动

E.终身不宜从事体力劳动

(63-66 题共用题干)

患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根，现麻醉未醒。

63.护士应置患者的体位是（）

- A.头低足高位
- B.头高足低位
- C.仰卧位
- D.平卧，头偏向一侧
- E.中凹卧位

64.术后第一天，护士主要观察患者有无发生（）

- A.倾倒综合征
- B.吻合口瘘
- C.术后出血
- D.排便困难
- E.排尿异常

65.患者进食后，主诉上腹饱胀，呕吐物为食物，含胆汁，考虑该患者可能发生了（）

- A.倾倒综合征
- B.吻合口梗阻
- C.吻合口瘘

D.输出襻梗阻

E.输入襻梗阻

66.术后第2周，患者进食30分钟后出现上腹饱胀、恶心、呕吐，自感头晕，考虑可能发生了（）

A.倾倒综合征

B.吻合口梗阻

C.吻合口瘘

D.术后出血

E.十二指肠残端破裂

**【多项选择题】** 每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个以上(包括五个)的答案是正确的，多选、少选或不选均不得分。

1-2 题共用题干

患者，女性，25岁，转移性右下腹痛6小时入院，有固定的压痛点，诊断为急性阑尾炎，准备手术治疗。

1.急性阑尾炎体征正确的是（）

A.右下腹压痛

B.腹膜刺激征常表示阑尾炎症加重

C.右下腹可扪及压痛性包块

D.腰大肌试验阳性

E.直肠指诊右前方有触痛

答案：ABCDE

2.术前护理正确的是（ ）

- A.肥皂水灌肠通便
- B.禁水 4 小时，禁食 12 小时
- C.协助患者舒适体位，如半卧位
- D.遵医嘱应用抗生素
- E.遵医嘱给予解痉止痛药

答案：CDE

3-4 题共用题干

患者，男性，45 岁，2 个月前出现排尿突然中断并疼痛，就诊确诊为膀胱结石。

3.膀胱结石典型症状正确的是（ ）

- A.膀胱刺激征
- B.排尿突然中断并感疼痛，常有终末血尿
- C.合并感染时膀胱刺激征加重，可出现脓尿
- D.前列腺增生
- E.排尿困难，点滴状排尿

答案：ABC

4.给予该患者的护理措施正确的是（ ）

- A.鼓励多饮水，保持每日尿量在 2000ml 以上
- B.可遵医嘱应用镇痛药物
- C.饮食指导
- D.可遵医嘱给予抗生素



E.给予留置尿管

答案: ABCD

.....

10.护理体检包括 ( )

A.视诊 B.触诊 C.叩诊 D.听诊 E.嗅诊

答案: ABCDE