

2024年“中银杯”四川省职业院校技能大赛（高职组）

护理技能赛项方案竞赛样题

一、【单项选择题】每题含A、B、C、D、E五个选项，选项中有一个答案是正确的，多选、少选或不选均不得分。

1. 病毒性心肌炎患者的治疗要点不包括（ ）

- A. 预防心力衰竭
- B. 抗生素治疗
- C. 抗病毒治疗
- D. 急性期卧床休息
- E. 防治心律失常

2. 患者，男，50岁。患肝硬化入院。自诉“皮肤瘙痒，睡觉的时候会把皮肤挠破”。皮肤瘙痒的原因可能是（ ）

- A. 叶酸缺乏
- B. 凝血时间延长
- C. 胆红素水平提高
- D. 高钾血症
- E. 低蛋白血症

（3-5 题共用题干）

患者，女，25岁，因皮肤出现瘀点、瘀斑及月经过多就诊，门诊以“慢性特发性血小板减少性紫癜”收入院。

3. 导致其血小板减少的主要原因是（ ）

- A. 出血
- B. 脾脏肿大及功能亢进
- C. 病毒感染
- D. 雌激素抑制血小板生成
- E. 自身免疫反应

4. 其血小板计数一般在（ ）

- A. $<20 \times 10^9/L$
- B. $20-30 \times 10^9/L$
- C. $30-80 \times 10^9/L$
- D. $80-100 \times 10^9/L$
- E. $>100 \times 10^9/L$

5. 其治疗首选药物为()

- A. 血小板悬液
- B. 糖皮质激素
- C. 止血药
- D. 环磷酰胺
- E. 雄激素

(6-7题共用题干)

患者，男，28岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：体温38.8℃，脉搏118次/分，血压118/78mmHg，右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室检查：白细胞 $14.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例0.82

6. 该患者阑尾位置最可能位于()

- A. 靠近闭孔外肌
- B. 腰大肌前方
- C. 盲肠中位
- D. 腰大肌后方
- E. 腰大肌侧面

7. 针对患者目前情况，下列措施不妥当的是()

- A. 手术下切除阑尾
- B. 腹腔镜下切除阑尾
- C. 阑尾切除
- D. 阑尾切除+腹腔引流管置入
- E. 非手术治疗

(8-10题共用题干)

患者男，68岁，今晨起床后突然跌倒，出现口眼歪斜，言语不清。既往有高血压、糖尿病、冠心病史。查体：神志清醒，血压138/90 mmHg，口角歪斜，右侧上下肢瘫痪，颅脑CT未见异常。

8. 该患者最可能的诊断是()

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性缺血发作

9. 该患者首选的治疗方法是()

- A. 调整血压

- B. 溶栓治疗
- C. 应用止血剂
- D. 手术治疗
- E. 脑保护剂

10. 该患者的护理措施不妥的是()

- A. 保持肢体功能位
- B. 翻身、拍背
- C. 调整饮食以防便秘发生
- D. 鼓励患者多饮水
- E. 由于瘫痪肢体不易移动, 可将静脉输液放在瘫痪肢体侧

(11-12题共用题干)

患者, 男, 55岁, 头痛3个月, 多见于清晨, 常出现癫痫发作, 经检查诊断为颅内肿瘤、颅内压增高, 拟行开颅手术。

11. 入院后第3日, 患者出现剧烈头痛呕吐频繁, 烦躁不安, 右侧瞳孔散大, 左侧肢体肌力减退, 病理征阳性。此时可能出现了()

- A. 左侧颞叶疝
- B. 大脑镰下疝
- C. 枕骨大孔疝
- D. 高血压危象
- E. 右侧颞叶疝

12. 行开颅手术后, 医师在手术中放置了脑室引流, 术后引流管护理, 不妥的是()

- A. 引流管开口高于侧脑室平面15cm
- B. 妥善固定引流管
- C. 每日引流量以不超过500ml为宜
- D. 定时无菌生理盐水冲洗
- E. 观察并记录引流液的颜色、性状和量

(13-14题共用题干)

患者, 男, 14岁, 因多饮多尿5年, 双眼视物不清3年, 头痛伴呕吐2个月入院。经检查诊断为颅咽管瘤。

13. 首选的治疗方法是()

- A. 手术治疗
- B. 化学治疗
- C. 放射治疗
- D. 免疫治疗

E. 基因治疗

14. 术后患者出现多尿，每日尿量大于4000ml，尿比重低于1.005。可能发生的并发症是（ ）

A. 尿失禁

B. 颅内高压

C. 泌尿系统感染

D. 药物副作用

E. 尿崩症

15. 在静脉补钾时，假设200ml液体，最多可加入10%氯化钾的量是（ ）

A. 12ml

B. 10ml

C. 8ml

D. 6ml

E. 3ml

16. 患者，刘某，41岁，因交通事故致伤昏迷，3小时后入院，患者处于昏迷状态，呼之不应，但按压眶上神经有反应，左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。入院第2天，血压150/100mmHg，脉搏缓慢有力，呼吸深而慢，时而躁动、呕吐，按压眶上神经无反应，左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体瘫痪，病理反射阳性。若进行手术治疗，则手术后护理的是（ ）

A. 高渗性脱水药20%甘露醇250ml 要在1小时内快速静脉滴注

B. 冬眠疗法可先用物理降温，再遵医嘱静滴冬眠药物

C. 冬眠疗法降温速度以每小时下降2℃为宜

D. 脱水治疗期间不需记录出入液量

E. 防止压疮、呼吸道和泌尿道感染等并发症

17. 此时如果处理不及时，该患者最可能发生下列哪项并发症（ ）

A. 肾功能衰竭

B. 肢体坏疽

C. 肺栓塞

D. 中毒性休克

E. 死亡

（18-19题共用题干）

患者，女性，38岁，5小时前摔伤右前臂。检查发现前臂肿胀，皮肤破损流血，瘀斑，剧痛并有短缩畸形。

18. 入院后给予清创复位，石膏外固定。48小时后患者出现体温升高，伤口有少量脓性分泌物，白细胞计数明显升高，此时最可能的情况是（ ）

A. 血肿吸收

- B. 伤口感染
- C. 组织坏死
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 气性坏疽

19. 患者恢复后，要拆除石膏，下列注意事项中错误的是（ ）

- A. 石膏拆除后，用温水清洗皮肤
- B. 拆石膏前需向患者解释，拆石膏无痛感，消除患者紧张
- C. 石膏拆除后，用酒精清洗皮肤
- D. 清洗后可以在皮肤处涂抹润肤油并按摩局部
- E. 石膏拆除后，患者刚开始活动时可能稍有不适，以后逐渐减轻

(20-22题共用题干)

患者，男性，22岁，高处坠落后出现严重呼吸困难、四肢不能活动。入院查体颈部压痛，四肢瘫痪，高热39.8℃，听诊闻及痰鸣音强。X线片提示：C4-C5骨折合并脱位。

20. 该患者呼吸困难最主要的原因是（ ）

- A. 腹胀引起膈肌上移
- B. 呼吸肌麻痹
- C. 水肿压迫呼吸中枢
- D. 气管受压
- E. 痰液阻塞气道

21. 对于该患者应首先采取下列哪项措施（ ）

- A. 吸痰
- B. 给予镇痛药物
- C. 气管切开
- D. 手术复位固定
- E. 吸氧

22. 减轻脊髓水肿和继发性损伤采取的措施是（ ）

- A. 地塞米松30-40mg持续静脉滴注2周
- B. 20%甘露醇250ml静脉滴注，Bid，5-7天
- C. 绝对平卧硬板床
- D. 枕颌吊带卧位牵引
- E. 维持动脉压在90mmHg以上

(23-25题共用题干)

患者，男性，18岁，跌倒时左手掌着地20分钟。查体：肘部向后突出并处于半屈状，肘部明显肿胀及压痛，肘后三角关系正常。

23. 根据检查结果，最适宜的处理措施是（ ）

- A. 单纯石膏固定
- B. 手法复位石膏固定
- C. 切开复位内固定
- D. 骨牵引治疗
- E. 弹力绷带8字固定

24. 患者次日出现发热，T 37.9℃，最常见的原因是（ ）

- A. 骨折内出血，血肿吸收
- B. 伤口感染
- C. 剧烈疼痛
- D. 软组织损伤
- E. 急性骨髓炎

25. 给予该患者护理不妥的是（ ）

- A. 促进神经循环功能的恢复
- B. 托起患肢，减轻疼痛
- C. 预防感染的发生
- D. 合理饮食
- E. 严格卧床3个月开始功能锻炼

(26-28题共用题干)

26. 检查发现T11椎体爆裂骨折，椎体压缩1/2，椎管内有较大骨块，伴关节突交锁。目前最适合采取哪种治疗方案（ ）

- A. 手术切开复位，椎管减压，脊柱内固定术
- B. 两点法过伸复位，石膏背心固定
- C. 激素脱水治疗
- D. 保守治疗
- E. 椎板切除、椎管减压术

27. 术后第6天，截瘫恢复不理想，在护理时，每2小时翻身一次，其目的是（ ）

- A. 防止肺炎、肺不张
- B. 防止下肢静脉血栓
- C. 防止压疮
- D. 防止尿潴留
- E. 促进睡眠

28. 该患者应该采用哪种翻身方式（ ）

- A. 轴线翻身

- B. 先翻背部
- C. 先翻下身
- D. 不能翻身
- E. 随意翻身

29. 患者左侧胸部被匕首刺伤半小时，有胸痛，呼吸急促，口唇发绀。脉搏120次/分，血压9.3/5.3 kPa（70/40mmHg）。左侧胸壁有伤口，呼吸时能听到空气出入伤口的响声，气管移向健侧，患侧叩诊呈鼓音。引起患者休克的主要原因是（ ）

- A. 血容量不足
- B. 纵隔摆动、回心血量减少
- C. 伤侧肺完全萎陷
- D. 心脏受压
- E. 健侧肺部分受压

（30-31题共用题干）

患者，女性，39岁，因排尿异常入院，诊断为急性泌尿系感染。

30. 下列情况最可能出现于该患者的是（ ）

- A. 一天排尿次数3-5次
- B. 离心尿检每高倍视野白细胞超过5个
- C. 膀胱容量300ml
- D. 每次尿量400ml
- E. 24小时尿量400ml

31. 为进一步诊治该患者需要做血管造影明确肾脏情况，下列叙述错误的是（ ）

- A. 造影后鼓励患者多饮水
- B. 造影后局部加压包扎，平卧6小时
- C. 造影后观察足背动脉搏动情况
- D. 造影前做碘过敏试验
- E. 有出血倾向的患者不宜做该检查

32. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根，现麻醉未醒。护士应置患者的体位是（ ）

- A. 头低足高位
- B. 头高足低位
- C. 仰卧位
- D. 平卧，头偏向一侧
- E. 中凹卧位

（33-34题共用题干）

患者，男性，42岁，因车祸致骨盆骨折，尿道流血入院。查体：血压82/40mmHg，脉搏128次/分，下腹压痛，局部肌紧张。

33. 对该患者的治疗护理措施错误的是()

- A. 需先行抗休克治疗
- B. 导尿试验导尿管多试插几次，若插入困难，不再勉强反复试插
- C. 平卧，不随意搬动
- D. 确定尿道连续，尿潴留者可行导尿术
- E. 尿潴留不宜导尿者可行膀胱穿刺

34. 患者行断端吻合术，下列术后护理措施错误的是()

- A. 生命体征的观察
- B. 遵医嘱合理补液
- C. 规定时间后拔出尿管，尿道不会再发生狭窄
- D. 遵医嘱使用抗菌素
- E. 发现伤口肿胀、体温升高立即通知医生

35. 患者，男性，25岁，运动后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿。该患者所患疾病保守治疗的适应症是()

- A. 有尿路感染
- B. 年老体弱者
- C. 肾功能欠佳
- D. 肾结石小于直径0.6cm
- E. 肾结石小于直径1cm

(36-37 题共用题干)

患者，男性，53岁，既往有肺结核病史7年，2周前出现尿频、尿急、尿痛并逐渐加重，且伴有排尿终末阶段可见的肉眼血尿。

36. 该患者最可能的诊断是()

- A. 急性膀胱炎
- B. 慢性膀胱炎
- C. 肾结核
- D. 肾肿瘤
- E. 前列腺增生

37. 最可能的致病途径是()

- A. 输尿管梗阻
- B. 细菌由尿道逆行侵入泌尿系统
- C. 结核菌经血液播散到肾

D. 细胞异常增生

E. 结节形成

38. 患者，男性，68岁，因尿频、尿急、尿痛并伴有肉眼血尿症状就诊，经诊断该患者为表浅膀胱肿瘤，首选的治疗方法是()

A. 经尿道膀胱肿瘤切除术

B. 膀胱部分切除术

C. 根治性膀胱全切

D. 放疗

E. 化疗

(39-40题共用题干)

某女性，患者，40岁。因腹痛、寒战高热恶心呕吐及黄疸2天入院，查体：T 40℃、P 200次/分、BP 90/50mmHg，表情淡漠，剑突下压痛明显，白细胞 $55.0 \times 10^9/L$ 。诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎，休克。

39. 此患者属于哪一类休克()

A. 感染性休克

B. 过敏性休克

C. 创伤性休克

D. 失血性休克

E. 心源性休克

40. 手术前护理时，观察要点不包括以下哪一项()

A. 生命体征及神志变化

B. 腹部症状及生命体征

C. 及时了解实验检查结果

D. 患者皮肤瘙痒是否减轻

E. 记录24小时出入量

二、【多项选择题】每题含A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个以上(包括五个)的答案是正确的，多选、少选或不选均不得分。

(41-42题共用题干)

患者，女性，25岁，转移性右下腹痛6小时入院，有固定的压痛点，诊断为急性阑尾炎，准备手术治疗。

41. 急性阑尾炎体征正确的是()

A. 右下腹压痛

B. 腹膜刺激征常表示阑尾炎症加重

C. 右下腹可扪及压痛性包块

- D. 腰大肌试验阳性
- E. 直肠指诊右前方有触痛

42. 术前护理正确的是()

- A. 肥皂水灌肠通便
- B. 禁水4小时，禁食12小时
- C. 协助患者舒适体位，如半卧位
- D. 遵医嘱应用抗生素
- E. 遵医嘱给予解痉止痛药

(43-44题共用题干)

患者，男性，45岁，2个月前出现排尿突然中断并疼痛，就诊确诊为膀胱结石。

43. 膀胱结石典型症状正确的是()

- A. 膀胱刺激征
- B. 排尿突然中断并感疼痛，常有终末血尿
- C. 合并感染时膀胱刺激征加重，可出现脓尿
- D. 前列腺增生
- E. 排尿困难，点滴状排尿

44. 给予该患者的护理措施正确的是()

- A. 鼓励多饮水，保持每日尿量在2000mL以上
- B. 可遵医嘱应用镇痛药物
- C. 饮食指导
- D. 可遵医嘱给予抗生素
- E. 给予留置尿管

.....

50. 护理体检包括()

- A. 视诊
- B. 触诊
- C. 叩诊
- D. 听诊
- E. 嗅诊